

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОКСИГЕЛЬ
(OXUGEL)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: benzoyl peroxide; 1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-(1-піперазиніл)-3-хінолінкарбонова кислота;

основні фізико-хімічні властивості: білий або майже білий гель, допускається наявність білих грудочок, що легко роздавлюються скляною паличкою;

склад: 1 г гелю містить бензоїлу пероксиду (в перерахуванні на суху речовину) 100 мг;

допоміжні речовини: карбопол, діетиламін, метилпарабен, пропіленгліколь, ароматизатор з запахом троянди, ароматизатор з запахом лаванди, вода очищена.

Форма випуску. Гель.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування акне. Код АТС D10A E01.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Чинить антисептичну, кератолітичну дію, гальмує (за рахунок вивільнення кисню) розвиток анаеробних мікроорганізмів *Propionibacterium acnes*. Препарат покращує оксигенацію тканин, пригнічує продуктивність шкірного жиру в сальних залозах.

Фармакокінетика. Невелика кількість гелю всмоктується через шкіру, де перетворюється в бензойну кислоту. Близько 5 % препарату виділяється в незміненому вигляді з сечею.

Показання для застосування. Вугри. Виразки нижніх кінцівок різного походження.

Спосіб застосування та дози. Оксигель застосовують для локального лікування звичайних (юнацьких) вугрів.

Вражені ділянки шкіри промити туалетним милом і водою, просушити обережними похлопуваннями за допомогою рушника або серветки. Нанести гель в кількості, достатній для того, щоб змазати всю уражену ділянку, і легко втерти його в шкіру. Препарат застосовувати 1-2 рази на день до повного зникнення вугрів.

При лікуванні виразки на нижніх кінцівках застосовувати пов'язку з препаратом 2 рази на добу протягом 2-3 тижнів.

Побічна дія. Гіперемія, набряк, висип на шкірі, сухість шкіри, алергічний контактний дерматит.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, пошкоджена шкіра в ділянці висипу вугрів.

Передозування. Про передозування Оксигелю повідомлень не надходило.

Особливості застосування. Потрібно уникати потрапляння цього препарату в очі і на слизові оболонки, якщо це трапилось, промити це місце великою кількістю води. Люди зі світлою шкірою можуть починати застосування препарату після проведення проби на чутливість з 1 разу на добу перед сном, залишаючи гель на обличчі на всю ніч. Цей препарат може відбілювати кольорові тканини. З обережністю призначають дітям віком до 12 років. Вагітним призначають тільки у випадку, якщо користь від застосування переважає потенційний ризик для плода. Під час лікування припиняють годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні Оксигелю і третиноїну може дезактивуватись дія третиноїну.

Умови та термін зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 8 до 25 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Гель 10 % по 20 г у тубах.

Виробник. "Елегант Індія".

Адреса. 205, Кіртіман, Ахмедабад-9, Індія.