

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
|вживанню|
АЛТЕМІКС |
(ALTHAEMIX)

Загальна|спільна| характеристика:

основні фізико-хімічні|фізико-хімічні| властивості: рідина від світло-коричневого|ясно-коричневого| до коричневого кольору|цвіту|, зі|із| специфічним запахом анісу. Допускається випадання осаду.

склад: 5 мл| сиропу містять|утримують| алтеї кореня екстракту 25 мг або алтеї кореня екстракту сухого, що містить алтеї кореня екстракту 25 мг;

допоміжні речовини: гліцирам|, натрію бензоат, натрію гідрокарбонат, амонію хлорид, олія|мастило,анісова, сорбіт, метилпарагідроксibenзоат, пропілпарагідроксibenзоат, , , ,Юетанол (96%), вода очищена|обчищена|.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корінь алтеї. Код АТС R05 С А05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Комплексний рослинний препарат; відхаркувальний засіб прямої дії, виявляє|робить,виявляє,чинить| обволікаючу, пом'якшувальну та протизапальну дію.

Корінь алтеї містить|утримує| рослинний полісахаридний| слиз (до 35%), а також аспарагін|, бетаїн|, пектинові речовини, крохмаль та ін.

Механізм дії обумовлений подразненням рецепторів шлунка і рефлекторною стимуляцією нейронів блювотного, дихального і кашльового центрів, що призводить|призводить,наводить| до посилення перистальтики бронхіол і підвищення активності миготливого епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія). Крім того, препарат підсилює|посилує| функцію бронхіальних залоз, спричиняючи|спричиняючи| розрідження мокротиння, зменшення його в'язкості і збільшення об'єму|обсягу| (резорбтивна| секретолітична| дія).

Рослинні слизи покривають слизові оболонки тонким шаром, який тривало зберігається на їх поверхні і запобігає|запобігає| роздратуванню. В результаті зменшується запальний процес і полегшується регенерація тканин. При дії на слизову оболонку шлунка захисна дія плівки зі|із| рослинного слизу тим триваліша|, чим вище кислотність шлункового соку (в'язкість рослинного слизу підвищується при взаємодії із|із| соляною кислотою шлункового соку).

Фармакокінетика|. Не досліджена.

Показання для застосування. Гострі та хронічні захворювання органів дихання, що супроводжуються|супроводяться| кашлем зі|із| утрудненим відділенням мокротиння: ларингіт, трахеїт|, трахеобронхіт, бронхіт, бронхіальна астма, коклюш|коклюш|.

Спосіб застосування|вживання| та дози. Призначають внутрішньо після|потім| їди|їди|.

Дорослим і дітям старше 12 років призначають 15 мл сиропу (3 мірних ложки). Дітям віком 6 – 12 років призначають по 10 мл сиропу (2 мірних ложки), віком 2 – 6 років – по 5 мл сиропу (1 мірна ложка), віком 1 – 2 роки – по 2,5 мл сиропу (½ мірної ложки). Кратність прийому для дорослих та дітей старше 6 років – 4 – 5 разів на добу, для дітей віком 2 – 6 років – 3 – 4 рази на добу, для дітей віком 1 – 2 роки – 1 – 3 рази на добу.

Дітям від 1- 6 років дозу препарату (2,5 мл - 5 мл) перед застосуванням розводять в одній столовій ложці кип'яченої води.

Тривалість курсу терапії визначається індивідуально залежно від ефективності лікування і складає, як

Сторінка 2 з 2. Видавець: Державний експертний центр МОЗ України
правило, 10 – 15 днів. За показаннями можливе призначення повторних і більш тривалих курсів лікування.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції (шкірні висипи, шкірний свербіж).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, дитячий вік до 1 року.

Передозування. *Симптоми:* нудота, блювання. *Лікування:* відміна препарату, промивання шлунка.

Особливості застосування|вживання|. Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення.

Утворення плівки з|із| рослинного слизу на поверхні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів|колії,доріг| не тільки|не лише| виявляє|робить,виявляє,чинить| виражений|виказаний,висловлений| лікувальний ефект, але й сприяє більш тривалій місцевій дії інших лікарських препаратів.

Оскільки препарат не містить|утримує| цукру, його можуть приймати хворі на цукровий діабет.

Перед застосуванням|вжитком,використанням| препарат слід збовтувати.

При застосуванні препарату у дітей слід враховувати, що одна мірна ложка сиропу (5 мл) містить 0,1 мл етанолу (96%), тому необхідно чітко дотримуватися вказаних доз для дітей.

Застосування|вживання| в період вагітності та годування груддю. Можливе тільки за призначенням лікаря.

Вплив на можливість|спроможність| керування транспортними засобами і механізмами. Дані відсутні.

Взаємодія з|із| іншими лікарськими засобами. При сумісному|спільному| застосуванні|вживанні| із|із| протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб прийом препарату можна поєднувати|сполучати| із натрію бікарбонатом. При сумісному|спільному| застосуванні|вживанні| із|із| протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння в дихальних шляхах|коліях,дорогах|; з|із| антибіотиками – підвищення концентрації антибіотиків у дихальних шляхах|коліях,дорогах|.

Умови та термін зберігання. Зберігати у щільно закритих флаконах або банках, у захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після|потім| розкриття|розтину| зберігати в прохолодному місці не більше 10 днів.

Термін придатності – 2 роки.

Упаковка. Сироп по 100 мл| у флаконах або банках, 1 флакон або банка разом з мірною ложкою у коробці.

Умови відпуску|відпуску|. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Адреса. Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.