

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РЕПАРИЛ-ГЕЛЬ Н
(REPARIL-GEL N)

Склад лікарського засобу.

Діюча речовина: 10 г гелю містить есцину 0,1 г та діетиламіну саліцилату 0,5 г;

допоміжні речовини: поліакрилова кислота, макрогол-6 гліцерол каприлокапрат, динатрію едетат, трометамол, ізопропіловий спирт, вода очищена, лавандова олія, неролієва олія.

Лікарська форма. Гель.

Прозорий, від безбарвного до світло-жовтого кольору гель із запахом лаванди та ізопропілового спирту.

Назва і місцезнаходження виробника. МАДАУС ГмбХ, 51101 Кельн, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТС С05С.

Фармакологічні властивості. Місцеве застосування есцину сприяє зменшенню відчуття болю спричиненого спортивними травмами, такими як розтягнення зв'язок та вивихи.

У випадку підвищеної проникності судин, що викликана запальними процесами, есцин пригнічує ексудацію, зменшуючи вивільнення рідини з судин у тканини та прискорює реабсорбцію існуючого набряку. Механізм дії ґрунтується на змінах проникності капілярних стінок. Крім того, есцин підвищує резистентність капілярів, пригнічує запальні процеси та поліпшує мікроциркуляцію.

Діетиламіну саліцилат має виражений аналгетичний ефект. Він вільно проникає крізь шкіру та виявляє знеболюючу дію в глибині ураженої ділянки. Додаткова протизапальна дія діетиламіну саліцилату збільшує протизапальний ефект есцину і, таким чином, протидіє етіологічним факторам перебігу хвороби.

Показання для застосування. Пошкодження внаслідок ударів, розтягнення, гематоми, синці, тендиніти (запалення тканин сухожилля).

Больові синдроми при захворюваннях хребта (защемлення міжхребцевого диска, остеохондроз, люмбаго, ішіалгія).

Флебіт поверхневих вен, варикозне розширення вен.

Лікування місцевих ускладнень після внутрішньовенних ін'єкцій чи інфузій.

Протипоказання. Гіперчутливість до саліцилатів, есцину чи інших інгредієнтів препарату.

Особливі застереження. Не слід наносити гель на пошкоджену шкіру, слизові оболонки чи на ділянки шкіри, що підлягають опроміненню. Необхідно уникати потрапляння препарату в очі.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності необхідно уникати тривалого застосування препарату та нанесення на великі ділянки шкіри.

У період годування груддю не слід наносити гель на ділянки молочних залоз.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Відсутня.

Діти. Немає обмежень щодо застосування препарату у дітей. Дані досліджень свідчать про відсутність системної токсичної дії. Репарил-гель Н не слід застосовувати у немовлят.

Спосіб застосування та дози. Якщо лікарем не призначено інакше, тонкий шар гелю наносять на уражені ділянки шкірного покриву, рівномірно розподіляючи по всій ділянці, від одного до декількох разів на добу.

Гель можна втирати в шкіру, але це не обов'язково.

Передозування. Про випадки передозування не повідомлялося.

Побічні ефекти. У край поодиноких випадках можуть спостерігатися шкірні алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Упаковка. Гель в тубі 40 г № 1.

Категорія відпуску. Без рецепта.