

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ НАСТОЙКА
(TINCTURA CRATAEGI)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтувато-буруватого кольору;

склад: 1 флакон (банка) містить настойки глоду плодів (1:10) 50 мл, 100 мл;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70 %.

1 мл містить 20 крапель.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в кардіології.

Код АТС С01ЕВ04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини, що містяться в плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'язу.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (у тому числі нейроциркуляторна дистонія).

Спосіб застосування та дози. Глоду настойку приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується застосовувати по 20 крапель настойки 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття). Дітям старше 14 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

Побічна дія. Рідко спостерігається сонливість, алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Діти віком до 14 років, жінки у період вагітності і годування груддю.

Передозування. При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардія, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Особливості застосування. Глоду настойку не рекомендують приймати під час їжі. Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 год.

Безпечність та ефективність застосування Глоду настойки у дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат у дітей віком до 14 років.

Вагітність і годування груддю.

Необхідно порадитись з лікарем щодо можливості застосування Глоду настойки в періоди вагітності та годування груддю.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами.

У період застосування препарату не можна керувати автомобілем та працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Не рекомендується приймати із солями алкалоїдів у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 8 °С до 15 °С. При зберіганні допускається випадання осаду. Перед застосуванням збовтувати.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл, 100 мл у флаконах; по 100 мл у банках.

Виробник. ВАТ "Біолік".

Адреса. Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.