

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА
(Calendula officinalis)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтувато-бурого кольору зі специфічним запахом;

склад: 1 флакон (банка) містить настойки квіток та квіткових кошиків календули (1:10) – 50 мл або 100 мл;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70 %;

1 мл містить 20 крапель.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран.

Код АТС D03A X09.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини, що містяться в квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти), чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Місцево як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна). Препарат застосовують внутрішньо як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози. Приймають внутрішньо за 15-30 хв до їди, розводячи у невеликій кількості теплої перевареної води. Дорослим рекомендується приймати по 10 - 20 крапель настойки 3-4 рази на день протягом 1 місяця. Дітям старше 12 років – із розрахунку 1 крапля настойки на 1 рік життя.

Для полоскання порожнини рота 1 чайну ложку Календули настойки розводять у склянці теплої кип'яченої води.

Спосіб застосування препарату для місцевих аплікацій залежить від характеру ураження шкіри і визначається лікарем.

Побічна дія. Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.

Діти віком до 12 років, жінки у період вагітності і годування груддю.

Передозування. При значному підвищенні дози можливі прояви підвищеної чутливості, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Особливості застосування.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами

При прийомі Календули настойки внутрішньо слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Календули настойка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів, зокрема препаратів на основі ромашки та деревію.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

При зберіганні допускається наявність осаду. Перед застосуванням збовтувати.

Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл, 100 мл у флаконах; по 100 мл у банках.

Виробник. ВАТ "Біолік".

Адреса. Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.