

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА
(TINCTURA CALENDULAE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-бурого кольору зі специфічним запахом;

склад: 1 флакон містить настойки квіток та квіткових кошиків календули (1:10) – 40 мл;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що сприяють загоюванню ран.

Код АТС D03A X18.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Біологічно активні речовини, що містяться в квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти) чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Застосовують місцево як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна), внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози. Календули настойку приймають внутрішньо за 15 – 30 хв до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'яченої води. Дорослим рекомендується приймати по 10 – 20 крапель настойки 3 – 4 рази на день протягом 1 місяця. Дітям з 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

Для полоскань порожнини рота 1 чайну ложку календули настойки розводять у склянці теплої кип'яченої води.

Застосовують для місцевих аплікацій при порізах, гнійних ранах, опіках. Розводять 1 чайну ложку препарату у склянці кип'яченої води.

Побічна дія. Можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж тощо).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується приймати внутрішньо протягом тривалого часу, а також дітям віком до 12 років і жінкам у період вагітності та годування груддю.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Особливості застосування. При прийомі настойки внутрішньо слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно-небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Календули настойка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в прохолодному (8 – 15 °С), захищеному від світла та недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається утворення осаду.

Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. У флаконах по 40 мл.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.