

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕКТУСИН
(PECTUSIN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору із солодко-охолоджуючим смаком, зі специфічним запахом;

склад: 1 таблетка містить ментолу – 0,004 г, олії евкаліпту – 0,0005 г;

допоміжні речовини: пудра цукрова, сіль натрієва карбоксиметилцелюлози, тальк медичний, кальцію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. АТС R05C A10.

Фармакологічні властивості. Таблетки Пектусин відносяться до лікарських засобів, які подразнюють переважно чутливі (аферентні) нервові закінчення слизових оболонок порожнини рота. Має протизапальний і певний антимікробний вплив.

Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату не вивчена.

Показання для застосування. Таблетки Пектусин призначають при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (фарингіти, трахеїти, бронхіти) у комплексному лікуванні.

Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 7 років призначають по 1 таблетці під язик (тримають у роті до повного розсмоктування) 3 - 4 рази на день. Тривалість застосування обумовлена вираженістю захворювання, досягнутим терапевтичним ефектом, характером супутньої терапії.

Побічна дія. Можуть спостерігатися місцеві алергічні реакції.

Протипоказання. Таблетки Пектусин протипоказані дітям до 7 років, при спазмофілії, крупі, при цукровому діабеті, у період вагітності та лактації, при індивідуальній несприйнятливості препарату загалом або його компонентів (ментол, олія евкаліптова).

Передозування. Не описане.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому місці. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 таблеток у контурній безчарунковій упаковці.

Виробник. Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство “Біостимулятор” у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Адреса. Україна, 65006, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 2.