

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА
(TINCTURA LEONURI)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: *leonurus cardiaca;*

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина бурого із зеленуватим відтінком кольору. Допускається випадання осаду в процесі зберігання;

склад: 1 флакон містить настойки трави пустирника (1:5) – 25 мл;

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Настойка для внутрішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M18**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. За характером дії настойка пустирника близька до препаратів валеріани. Препарат спричиняє заспокійливий ефект за рахунок посилення процесу уповільнення або зниження процесу збудження у центральній нервовій системі. Снодійного впливу не виявляє, але полегшує настання фізіологічного сну та поглиблює його. Не спричиняє звикання, психічної залежності.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом), підвищена емоційна збудливість, дратівливість, легкі форми порушень сну.

Спосіб застосування та дози. Настойку приймають внутрішньо. Якщо лікар не призначив іншу схему лікування, дорослим рекомендується застосовувати по 30-50 крапель препарату 3-4 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком з 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя. Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру і ступеня тяжкості патологічного процесу, особливостей перебігу захворювання, переносимості препарату та стабільності досягнутого лікувального ефекту.

Побічна дія. Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж), відчуття стомленості, сонливість, запаморочення, зниження артеріального тиску. У разі передозування слід припинити застосування препарату. В подальшому – симптоматична та підтримуюча терапія (відповідно клінічному стану хворого).

Протипоказання. Настойка пустирника протипоказана при вираженій гіпотензії (зниженні артеріального тиску) та індивідуальній непереносимості компонентів препарату.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у період вагітності та годування груддю і дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату.

Особливості застосування. Препарат містить спирт! Тому слід бути обережним при керуванні автомобілем та роботі з іншими механізмами. Седативний ефект розвивається повільно протягом трьох тижнів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Посилює ефекти снодійних, анагетичних та седативних засобів.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. *Зберігати у захищеному від дітей місці!* Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Термін придатності - 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 мл у флаконах скляних.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.