

І Н С Т Р У К Ц І Я**для медичного застосування препарату
СТРЕПСІЛС® З ВІТАМІНОМ С зі смаком апельсина
(Strepsils® Vitamin C with orange)****Загальна характеристика:**

основні фізико-хімічні властивості: оранжеві круглі ледяники, або оранжеві круглі ледяники із знаком S з двох сторін;

склад: 1 ледяник містить спирту 2,4-дихлорбензилового 1,2 мг, амілметакрезолу 0,6 мг, натрію аскорбату 74,9 мг, аскорбінової кислоти 33, 5.

допоміжні речовини: ароматизатор апельсина, левоментол, пропіленгліколь, барвник «Сансет жовтий» (E110), барвник «Понсо 4R» (E124), кислота винна, рідка глюкоза, рідка сахароза.

Форма випуску. Ледяники.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Ефективність препарату зумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів, активних відносно широкого спектра грамполозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. Аскорбінова кислота забезпечує зростаючу потребу організму у вітаміні С під час інфекційно-запальних захворювань.

Фармакокінетика. Фармакокінетичні показники не вивчалися.

Показання для застосування. Препарат застосовують для симптоматичного лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та глотки.

Спосіб застосування та дози. Рекомендовано дорослим і дітям віком від 5 років. При появі перших симптомів запалення у ротовій порожнині або глотці приймати по 1 ледянику кожні 2-3 години. Ледяник необхідно розсмоктувати до його повного розчинення. Не вживати більше 8 ледяників протягом 24 годин.

Побічна дія. У рідкісних випадках – алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Передозування. Завдяки складу препарату його випадкове чи навмисне передозування може виявлятися лише симптомами дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту. У такому разі показано симптоматичне лікування.

Особливості застосування. Якщо симптоми захворювання зберігаються більше 3 днів, супроводжуються високою температурою, головним болем або іншими явищами, необхідно звернутися до лікаря. Не перевищувати зазначену вище дозу. Хворі на цукровий діабет мають враховувати, що 1 ледяник містить близько 2,6 г цукру.

Зважаючи на лікарську форму, не рекомендується застосовувати у дітей до 5 років.

Жінкам під час вагітності і годування груддю до початку застосування препарату необхідно порадитися з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Клінічно значущої взаємодії препарату з лікарськими засобами інших груп не виявлено.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°C. Термін придатності - 3 роки.

Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 24 ледяники в упаковці.

Виробник.

Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл.

Адреса.

Nottingham NG90 2DB, United Kingdom.