

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ НАСТОЙКА
(TINCTURA CRATAEGI)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: fructus Crataegi;

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтого до коричневого кольору з оранжево-червоним відтінком. При зберіганні допускається випадання осаду;

склад: 1 флакон містить 25 мл або 100 мл настойки плодів глоду (1:10);

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в кардіології.

Код АТС С01Е В04.

Фармакологічні властивості. Біологічно-активні речовини, що містяться в плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 год.

Показання для застосування. Глоду настойку застосовують при функціональних розладах діяльності серцево-судинної системи (нейро-циркуляторні дистонії та ін.), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Спосіб застосування та дози. Глоду настойку приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується вживати по 20 крапель настойки 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття тощо). Дітям з 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

Побічна дія. Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого тиску, алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Протипоказання. Глоду настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості компонентів препарату.

Безпечність та ефективність застосування глоду настойки у дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат у дітей віком до 12 років.

Відносно можливості застосування глоду настойки в періоди вагітності та годування груддю необхідно порадитись з лікарем.

Передозування. Можливе виникнення сонливості, брадикардія, що не потребує відміни препарату.

Особливості застосування. Препарат не рекомендують приймати під час їжі, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Прийом з солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Умови та термін зберігання. У прохолодному, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Термін зберігання – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони по 25 мл або 100 мл.

Виробник. ВАТ “Лубнифарм”.

Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.