

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ЙОД**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* йод;  
100 мл розчину містять йоду 5 г;  
*допоміжні речовини:* калію йодид, спирт етиловий 96%, вода очищена.

**Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора у тонкому шарі рідина червоно-бурого кольору з характерним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика.  
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.  
Код АТС D08A G03.

*Фармакологічні властивості.*

Препарат містить елементарний йод, для якого характерними є протимікробна, місцевоподразнювальна та відтяжна дії. При нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму. Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

**Показання для застосування.**

Застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при діабетичних, трофічних виразках.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Слід бути обережними при застосуванні йоду на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Не допускати потрапляння препарату в очі. Слід бути особливо обережними при застосуванні йоду у пацієнтів зі світлим волоссям.

Не слід застосовувати на великі ділянки шкіри через можливий розвиток опіку.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

Відсутні.

**Спосіб застосування та дози.**

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

**Передозування.**

При передозуванні можливі явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слюзотеча, слинотеча, вугрові висипи на шкірі), опіки, подразнення шкіри.

Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.**

Можлива поява нежитю, кропив'янки, набряку Квінке, слино- та слюзотеча, висипів на шкірі, контактного дерматиту.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25°C.

**Упаковка.**

По 10 мл, 20 мл, 5 кг у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.