

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МЕНОВАЗИН
(MENOVASIN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із запахом ментолу;

склад: 40 мл рідини містять: ментолу 1 г, новокаїну 0,4 г, анестезину 0,4 г;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Рідина для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби). Код АТС D04A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Меновазин є місцевоанестезуючим засобом, специфічна дія якого зумовлена речовинами, що входять до його складу. Препарат чинить також протисвербіжну дію. При нанесенні на шкіру спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання. Чинить легку знеболювальну дію.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні препарат не проникає в кров.

Показання для застосування. Як протисвербіжний засіб призначають при сверблячих дерматозах. Як місцевоанестезуючий засіб – при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо дорослим і дітям старше 12 років. Болісні ділянки шкіри розтирають Меновазином 2-3 рази на день. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

Побічна дія. При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. При тривалому застосуванні препарату можливі подразнення шкіри, висипи.

Особливості застосування. Не наносити на ушкоджену та алергізовану шкіру. Не допускається потрапляння препарату в очі.

Вагітність та годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату в період вагітності та годування груддю не вивчалися, тому призначати його слід з урахуванням співвідношення користь для матері / ризик для плода (дитини).

Дитячий вік. Безпека та ефективність застосування Меновазину у дітей віком до 12 років не встановлені, тому застосовувати препарат дітям цієї вікової групи можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Компоненти препарату (новокаїн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

Умови та термін зберігання. Зберігати у прохолодному (8 - 15 °С) місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 мл у флаконах.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика “Віола”.

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.