

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
Гедерин
(Hederin)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина світло-коричневого кольору з характерним запахом, солодка на смак. У процесі зберігання допускається опалесценція і утворення осаду.

склад: 1 мл сиропу містить сухого екстракту листя плюща (при вмісті гедеракозиду С 14%) 4,5 мг;

допоміжні речовини: сорбіту розчин (Е 420), ксантанова камідь, натрію карбоксиметилцелюлоза, калію сорбат, ароматизатор, вода очищена.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A16.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Основними біологічноактивними речовинами екстракту плюща звичайного є сапонінові глікозиди, які підсилюють секрецію бронхіальних залоз, мають секретолітичні, відхаркувальні, а також загальнозміцнювальні та тонізуючі властивості. Завдяки вмісту дубильних речовин, пектинів, смоли, ефірної олії препарат має протизапальну, антисептичну та ранозагоювальну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання органів дихання, що супроводжуються кашлем та утворенням густого в'язкого мокротиння (бронхіт, трахеобронхіт, бронхіальна астма, бронхоекстатична хвороба, бронхоспазм).

Спосіб застосування та дози. Внутрішньо дітям віком від 1 до 6 років по 5 мл сиропу тричі на добу; дітям віком від 7 до 10 років - по 10 мл сиропу тричі на добу, дітям віком від 11 до 18 років та дорослим призначають по 10-15 мл сиропу тричі на добу. Тривалість курсу лікування становить до 7 днів. Для досягнення стабільного терапевтичного ефекту рекомендують продовжити терапію ще 2-3 доби.

Побічна дія. Іноді може виникати діарея. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Містить сорбітол і не рекомендується для застосування у хворих з непереносимістю фруктози. Діти віком до 1 року.

Передозування. Нудота, діарея. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. Досвіду застосування препарату під час вагітності та годування груддю немає. Препарат не містить алкоголю, цукру та барвників.

Перед кожним застосуванням необхідно ретельно збовтувати флакон!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами небажаної дії препарату не спостерігалось.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 15°C до 25°C у недоступному для дітей місці. Термін придатності — 5 років. Після першого розкриття упаковки препарат придатний протягом 6 місяців.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 90 мл у флаконі або банці з дозуючою скляночкою в картонній паці.

Виробник. ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика".

Адреса. Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.