

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТРИХОМОНАДЕН-ФЛЮОР-ІН'ЄЛЬ
(TRICHOMONADEN-FLUOR-INJEEL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин без запаху;

склад: 1,1 мл містить: Trichomonaden-Fluor-Nosode D 10 – 0,367 мл, Trichomonaden-Fluor-Nosode D 30 – 0,367 мл, Trichomonaden-Fluor-Nosode D 200 – 0,367 мл;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат чинить специфічну імунокоригуючу, дезінтоксикаційну та протизапальну дію при трихомонадній інфекції. Дія препарату базується на активації імунітету та детоксикаційних процесів в організмі і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. У комплексній терапії гострих та хронічних запальних захворювань сечостатевої системи у чоловіків і жінок, пов'язаних з трихомоніазом (ендометрит, сальпінгіт та оофорит, уретрит, простатит), що перебігають з вираженим свербінням та великою кількістю виділень.

У комплексній терапії хронічних запальних захворювань соматичних органів, що виникають на фоні хронічного перебігу трихомоніазу.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 1,1 мл. Застосовувати разову дозу 1 – 3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально (розчинити разову дозу в 5 – 10 мл води та випити, затримуючи на декілька секунд у роті).

Курс лікування: 2 – 4 тижні.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Не відомі.

Передозування. Не відзначалось.

Особливості застосування. На початку лікування можливе короткочасне посилення виділень із статевих шляхів, що є ознакою активного виведення токсинів і не потребує припинення лікування.

Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішується індивідуально з урахуванням співвідношення користь для матері / ризик для плода (дитини).

Досвід застосування препарату у дітей віком до 12 років відсутній.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. 5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.