

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ХОМВІОКОРИН® - N**  
**(HOMVIOCORIN® - N)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** розчин коричневого кольору, з спиртовим запахом, гіркий на смак, можливий незначний осад, що фільтрується;

**склад:**

10 мл розчину містять:

Adonis vernalis Ø	горицвіту весняного Ø	0,2 мл,
Scilla Ø	морської цибулі Ø	0,3 мл,
Solidago virgaurea Ø	золотушника звичайного Ø	2 мл,
Convallaria majalis Ø	конвалії травневої Ø	6,25 мл,
Crataegus Ø	глоду Ø	1,25 мл;

*допоміжна речовина:* етанол.

**Форма випуску.** Краплі для перорального застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТС С01Е  
Х.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Комплексний гомеопатичний засіб для лікування хронічної серцевої недостатності. Містить серцеві глікозиди рослинного походження. Горицвіт весняний – типу карденолідів - строфантину; конвалія травнева – конвалітоксин; морська цибуля – типу буфадієналідів - просциларидин-А, сциларен-А. Максимальна денна доза Хомвіокорину® – N містить максимально 0,9 мг серцевих глікозидів.

1. Кардіотонічний ефект обумовлений позитивним інотропним ефектом за рахунок:
  - блокади  $K^+/Na^+$  - АТФази і зміни внутрішньоклітинної концентрації іонів  $Ca^{++}$ ,
  - прямої дії на скоротливі білки (актин-міозин) кардіоміоциту.
2. Негативний хронотропний ефект обумовлений пригніченням автоматизму синусового вузла.
3. Позитивний батмотропний ефект мінімально виражений за рахунок малих доз серцевих глікозидів морської цибулі.
4. Діуретичний ефект обумовлений покращанням ниркової гемодинаміки і видільної функції нирок за рахунок зниження реабсорбції у каналцях та виділення натрію (вищезазначені глікозиди і золотушник звичайний).
5. Мембраностабілізуючий і антиоксидантний ефект завдяки глоду.

**Показання для застосування.**

- Хронічна серцева недостатність I –IIA стадії як монотерапія (III функціональний клас – у складі комбінованої терапії);
- безсимптомна дисфункція лівого шлуночка.

**Спосіб застосування та дози.**

При хронічному перебігу хвороби початкова доза для дорослих та дітей з 12 років становить 10-20 крапель 1-3 рази на добу. При недостатньому ефекті дозу слід збільшити до 30 крапель 3 рази на добу. Тривалість терапії визначається індивідуально, але має тривати не менше 2-3 місяців.

У гострих випадках призначають по 10-15 крапель кожні півгодини або щогодини, але не більше, як 12 разів на добу. При послабленні проявів серцевої недостатності дозу зменшують до 15 крапель 3 рази на добу.

Після 2-3 місяців приймання переходять на підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на день або через день протягом тривалого часу.

Краплі приймають за 30 хв до або через 30 хв після їжі на шматочку цукру або хліба, повільно їх

розсмоктуючи, або з ковтком води, утримуючи його у роті якнайдовше.

**Побічна дія.**

Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату.

**Протипоказання.**

Дитячий вік до 12 років. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Передозування.**

*Прийом великої кількості препарату може спричинити отруєння алкоголем. Вживання усього флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм 22 г спирту.*

**Особливості застосування.**

Після прийому першої дози препарату можливе короточасне загострення основних симптомів (гомеопатичний ефект першої дози). В такому випадку необхідно тимчасово зменшити частоту прийому або дозу препарату.

Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку лікування. На відміну від препаратів дигіталісу і строфанту не кумулюється, суттєво не впливає на функцію провідності, має м'який, але стійкий ефект. Може використовуватись для лікування ХСН у хворих з брадикардією, значними дистрофічними змінами в серці. Може замінити традиційні серцеві глікозиди (дигоксин) у разі протипоказань до їх застосування. Не потребує насичення в початковий період лікування і може застосовуватися періодично та повторними курсами. Завдяки діуретичному та натрійуретичному ефектам може використовуватися в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії. Безпека застосування у вагітних та дітей віком з 12 років у рекомендованих дозах доведена клінічними дослідженнями. В рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом та праці зі складними механізмами.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.**

Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі. Може використовуватися в комбінації з діуретиками, інгібіторами АПФ, периферичними вазодилататорами, блокаторами  $\beta$ -адренорецепторів. Куріння, вживання алкоголю і збуджуючих речовин (чай, кава) негативно впливають на дію гомеопатичних засобів.

**Умови зберігання.**

Зберігати в недоступних для дітей місцях, при температурі не вище 30°C.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Флакон по 50 мл з крапельницею у картонній коробці.

**Виробник.**

Хомвіора Арцнайміттель

Др. Хагедорн ГмбХ і Ко.

**Адреса.**

Арабеллаштрассе, 5

D-81925 Мюнхен, Німеччина.