

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРТУСИН
(PERTUSSINUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: коричнева рідина, солодка на смак, з ароматним запахом;
склад: 100 г препарату містять екстракту рідкого трави чебрецю або тим'яну 12 г, калію броміду 1 г;
допоміжні речовини: сироп цукровий, спирт етиловий 80 %.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A10.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Пертусин належить до групи секретомоторних засобів. Послаблює кашель та чинить заспокійливу дію. Стимулює фізіологічну активність миготливого епітелію і перистальтичні рухи бронхіол, сприяючи просуванню мокротиння із нижніх у верхні відділи дихальних шляхів і його виведенню.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (бронхіт, трахеїт), пневмонії, коклюші.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо. Дорослим та дітям старше 12 років призначають по 1 столовій ложці 3 рази на день. Дітям віком від 2 до 6 років – по ½ чайної ложки (2,5 мл), від 6 до 9 років – по 1 чайній ложці (5 мл), від 9 до 12 років – по 1 десертній ложці 3 рази на день.

Дітям віком до 6 років разову дозу препарату (½ чайної ложки) необхідно розчинити у 20 мл (2 десертні ложки) охолодженої кип'яченої води.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.

Побічна дія. При тривалому застосуванні можуть виникнути явища бромізму: шкірний висип, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, у тому числі до бромідів, декомпенсована серцево-судинна недостатність, артеріальна гіпотензія, виражений атеросклероз, анемія, захворювання нирок.

Передозування. Можливі явища бромізму: шкірний висип, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія.

Особливості застосування. Тільки для внутрішнього застосування. Препарат містить цукровий сироп, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.

Вагітність і годування груддю. Застосування препарату можливе з урахуванням співвідношення користь для жінки / ризик для плода (дитини).

Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Бажано утриматись від керування автотранспортом і виконання роботи, що потребує підвищеної уваги та швидкості реакції, через імовірність таких побічних ефектів, як загальна слабкість, атаксія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у прохолодному (8 - 15 °С) місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 г у флаконах.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.