

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕМОРРОН
(HEMORRON)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: однорідна, прозора, жовтуватого кольору масляниста мазь із запахом риб'ячого жиру;

склад: 1 г мазі містить: фенілефрину гідрохлориду 2,5 мг, жиру печінки акули (вітамін А) 30,0 мг (500 МО);

допоміжні речовини: петролатум (вазелін), олія мінеральна, ланолін, віск білий, парафін, віск мікрокристалічний, спирт ланоліновий, вода очищена, гліцерин, олія кукурудзяна, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), кислота бензойна (Е 210), бутилгідроксіанізол (Е 320), токоферол (вітамін Е), олія чебрецю.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Антигемороїдальні препарати для місцевого застосування. Код АТС С 05А Х03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Комбінований препарат, дія якого зумовлена властивостями компонентів, які входять до його складу, сприяє розсмоктуванню гемороїдальних вузлів та забезпечує швидке усунення болісної пекучості, свербіжу та інших дискомфортних явищ усередині та зовні заднього проходу.

Жир печінки акули (вітамін А) має виражену протизапальну, гемостатичну дію, стимулює репаративні процеси, сприяє загоюванню ран та мікротріщин.

Фенілефрину гідрохлорид – симпатоміметик, який здебільшого стимулює альфа-адренорецептори, має місцеву судинозвужувальну дію, обумовлює антиексудативну дію, зменшує набряк, свербіж, нормалізує співвідношення між притоком та відтоком крові у кавернозних тільцях прямої кишки.

Фармакокінетика.

Фенілефрину гідрохлорид добре всмоктується. Жир печінки акули (вітамін А): швидко всмоктується. Дія препарату настає дуже швидко після його застосування і триває від 30 хв до 4 год. Біотрансформація препарату, який потрапив у загальний кровотік, відбувається в печінці. Виводиться нирками і з калом.

Показання для застосування.

Зовнішній та внутрішній геморої, що супроводжується запаленням гемороїдальних вузлів, симптомами болісного печіння, свербіжу, відчуттям дискомфорту.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовується зовнішньо та внутрішньоректально дорослими і дітьми старше 12 років .

Зовнішнє застосування. Промити і осушити серветкою або туалетним папером ділянки, уражені гемороєм, тонким шаром нанести мазь. Застосовувати вранці, перед сном та після дефекації до 4-х разів на день.

Внутрішньоректальне застосування. Зняти з аплікатора захисну кришку. Надіти аплікатор на різьбу наконечника туби з маззю. Видавити деяку кількість мазі, щоб заповнити аплікатор. Добре змастити аплікатор маззю і обережно ввести його у задній прохід. Натиснувши на тубу, видавити мазь з аплікатора, вилучити аплікатор і нанести мазь тонким шаром на шкіру навколо заднього проходу.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Після кожного застосування аплікатор ретельно очищати і закривати захисною кришкою.

Регулярне застосування препарату забезпечує усунення симптомів захворювання. Обмежень щодо тривалості застосування немає, але якщо після 7 днів стан не покращується лікування слід припинити.

Побічна дія.

У поодиноких випадках після застосування мазі можуть спостерігатися алергічні реакції, кровотеча, подразнення слизової оболонки прямої кишки та прилеглих тканин. При появі побічної дії слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Слід з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, щитоподібної залози, діабетом, підвищеним артеріальним тиском, а також особам з тяжкими хронічними захворюваннями нирок і печінки, з утрудненим сечовиділенням, зумовленим аденомою простати.

Передозування.

При випадковому передозуванні препарату можуть відмічатися алергічні реакції, нудота, блювання, головний біль, незначне підвищення артеріального тиску, збудження або пригнічення центральної нервової системи, неспокій, кровотеча і подразнення слизової оболонки. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування.

Не рекомендується перевищувати дозу, вказану в інструкції. Не слід застосовувати аплікатор, якщо його введення спричиняє біль або після застосування препарату виникає кровотеча. У цьому разі слід провести необхідні дослідження. Застосування препарату вагітними, жінками, які годують груддю, можливо у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плоду. Не рекомендується застосовувати дітям до 12 років. Спеціальних застережень щодо керування автомобілем немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Не рекомендується застосовувати Геморрон одночасно з препаратами для зниження артеріального тиску та антидепресантами. Геморрон можна застосовувати через 14 днів після приймання інгібіторів моноамінооксидази.

Умови та термін зберігання.

Зберігати в недоступних для дітей місцях при температурі не вище 25 °С.

Термін зберігання - 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка.

Мазь у тубі по 57 г. Туба ламінована, білого кольору, з білою кришечкою з поліпропілену. Аплікатор для внутрішньоректального введення з поліпропілену чорного кольору. Картонна коробка.

Виробник. Фармасайнс Інк.

Адреса. 6111 Роялмаунт Авеню 100 Монреаль, Квебек H4P 2T4 Канада