

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату:
ТУСАВІТ
(TUSSAVIT®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, темно-коричневого кольору сироп з м'яким, характерним смаком;
склад: рідкий екстракт чебрецю звичайного (1:1) та рідкий екстракт подорожника ланцетелистого (1:1);
допоміжні речовини: сахароза, гліцерин, карамель, натрію бензоат, вода дистильована.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R 05 CA10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Рідким екстрактам чебрецю (листки чебрецю звичайного) та подорожника (листки подорожника ланцетелистого) притаманна протикашльова (муколітична, відхаркувальна) та спазмолітична дія на дихальні шляхи, а також дезінфікуюча дія на слизову оболонку ротової порожнини, верхніх та нижніх дихальних шляхів.

Чебрець має виражену антибактеріальну, антисептичну, спазмолітичну, протикашльову дію з вираженою секретолітичною активністю. Рідкий екстракт чебрецю розріджує липкий слиз і в такий спосіб полегшує процес відкашлювання.

Подорожнику притаманні протизапальна, антисептична дія. Рідкий екстракт подорожника пом'якшує кашель при катаральних явищах верхніх дихальних шляхів.

Отже, ТУСАВІТ пом'якшує кашель, полегшує відходження бронхіального слизу та полегшує дихання.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та підлітки	1-2 чайні ложки (5-10 мл)	6 разів на добу
Діти від 6 до 14 років	1 чайна ложка	3-6 разів на добу
Діти від 2 до 6 років	1 чайна ложка	2-3 рази на добу

Рекомендується приймати ТУСАВІТ за півгодини до або після їди.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції при гіперчутливості до одного з компонентів препарату.

Протипоказання. Підвищена чутливість до одного із інгредієнтів препарату.

Враховуючи те, що ТУСАВІТ містить цукор, не слід застосовувати хворим на цукровий діабет. Не слід приймати дітям до 2 років.

Передозування. Не спостерігалось.

Особливості застосування.

Застосування в період вагітності та лактації.

Не існує застережень щодо прийому препарату під час вагітності та лактації.

Вплив на здатність керувати автомобілем і механізмами.

ТУСАВІТ не впливає на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Не впливає на психофізичний стан і не спричинює сонливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності - 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка.

100 мл (125 г) пляшка з кришечкою, що закручується, упакована в картонну коробку;

200 мл (250 г) пляшка з кришечкою, що закручується, упакована в картонну коробку.

Виробник. Фармацевтичне Фабрік МОНТАВІТ ГмбХ., Австрія.

Адреса. Зальбергштрассе 96, А-6060 Абзам, Тіроль, Австрія.