

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### ПРОПОЛІС *Propolis*

#### **Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** супозиторії від світло-коричневого до темно-коричневого кольору, сигароподібної форми, зі специфічним запахом. Допускається наявність нальоту і неоднорідність забарвлення у вигляді крапель та мармуровості;

**склад:** 1 супозиторій містить фенольного гідрофобного препарату прополісу, в перерахунку на 50% вміст суми фенольних сполук – 0,1 г;

**допоміжні речовини:** диметилсульфоксид, пропиленгліколь, твердий жир.

**Форма випуску.** Супозиторії ректальні.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування ран та виразкових уражень.

Код АТС D03AX12.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Фенольний гідрофобний препарат прополісу забезпечує протизапальну, репаративну та антимікробну дію. Присутність димексиду у складі супозиторіїв доповнює спектр активності препарату знеболюючими властивостями, підвищує резорбцію фармакологічних речовин крізь слизову оболонку.

Пропиленгліколь і основа створюють умови для реалізації терапевтичних ефектів діючих речовин супозиторіїв.

*Фармакокінетика.* Не вивчалася.

**Показання для застосування.** Проктити, анальні тріщини, післяопераційні рани дистального відділу прямої кишки.

**Спосіб застосування та дози.** Для дорослих і дітей старше 7 років по

1 супозиторію 3 рази на добу після спорожнення кишечника. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання та може скласти від 8-10 днів до 14-21 дня.

**Побічна дія.** Можливі алергічні реакції.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату, алергічні реакції на продукти бджільництва. Дитячий вік до 7 років.

**Передозування.** Не встановлено.

**Особливості застосування.** З обережністю слід застосовувати для лікування дітей, вагітних і в період годування груддю з урахуванням співвідношення ризик/користь.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Можна застосовувати в комбінації з іншими препаратами, призначеними для лікування супутніх захворювань. Не рекомендоване одночасне застосування з іншими продуктами бджільництва.

**Умови та термін зберігання.** В захищеному від світла місці при температурі від + 8 °С до +15 °С. В недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 2 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону.

**Виробник.** ЗАТ "Лекхім-Харків".

**Адреса.** Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.