

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПАНТЕНОЛ
(PANTHENOL)

Загальна характеристика :

міжнародна та хімічна назви: декспантенол;

(+)-®-3-(2,4-дигідроксі-3,3-диметилбутирамід)пропіонова кислота;

основні фізико-хімічні властивості: блідно-жовта гомогенна мазь ;

склад: 1 г мазі містить 50 мг декспантенолу;

допоміжні речовини: гліцерин концентрований, вазелін білий, ланолін зневоднений, парафін рідкий, парафін твердий, вода очищена, спирт стеариловий, спирт цетиловий.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування ран і виразкових уражень. Код АТС - D03A X03.

Фармакологічні властивості. Декспантенол є попередником пантотенової кислоти, складової частини ацетилкоферменту А, необхідного для нормального метаболізму в усіх клітинах, особливо в клітинах шкіри та слизової. Хоча пантотенова кислота не виявляє фармакологічної дії, однак вважають, що вона прискорює рубцювання та епітелізацію пошкодженої шкіри та запаленої слизової.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні декспантенол добре проникає у клітини шкіри та слизової, де відразу перетворюється у пантотенову кислоту. Відсутні дані відносно того, який процент із застосованого на шкіру препарату проникає у системну циркуляцію.

Зв'язування з протеїнами плазми: пантотенова кислота зв'язується з -глобуліном та альбумінами плазми. Пантотенова кислота ресорбується всіма тканинами, не метаболізується та виводиться у незмінному вигляді, 60-70 % з сечею, а решта – з калом. Виділяється з молоком.

Показання для застосування. Опіки I та II ступеня, подразнення шкіри, спричинене УФ-опроміненням, попрілість сідничної ділянки у немовляти, тріщини сосків молочної залози у жінок у період лактації, хронічне виразкове ураження шкіри, пролежні, трансплантати шкіри, по черзі з терапією глюкокортикоїдами. Для догляду за сухою, огрубілою та постарілою шкірою.

Спосіб застосування та дози. 2-3 рази на добу мазь наносять на ушкоджену поверхню шкіри.

Побічна дія. Можлива алергічна контактна екзема.

Протипоказання. Алергія, гемофілія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Пантенол може підсилювати дію деполаризуючих міорелаксантів (суксаметоній, декаметоній) і зменшувати дію недеполаризуючих міорелаксантів (D-тубокурарин, галамін) у зв'язку з тим, що стимулює синтез ацетилхоліну.

Передозування. Не відоме.

Особливості застосування. Мазь не наносять на мокнучі рани. Вагітність і лактація не є протипоказаннями. При застосуванні мазі при тріщинах сосків перед годуванням дитини залишки мазі необхідно забрати за допомогою чистих м'яких серветок та обмити сосок і шкіру теплою перевареною водою.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі 15-25°C.

Термін придатності 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Мазь, 30 г у тубі.

Виробник. «Хемофарм» АД, Сербія.

Адреса. 26300 м. Вршац, Белградський шлях б/н;
тел.: 381/13/821345.