

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛІЦЕРИН
(GLICEROL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: гліцерин;
25 г препарату містять гліцерину 21,25 г (в перерахуванні на 100 % безводну речовину).

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування.

Сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна, прозора рідина.
Дуже гігроскопічна.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Галичфарм».
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група.

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією.

Код АТС D02A X*.

Фармакологічні властивості.

Гліцерин виявляє пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

Показання для застосування.

Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо обробляють шкіру та слизові оболонки, роблять аплікації 30 % розчином на суху шкіру.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у щільно закупореній тарі при температурі 8 - 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці

Упаковка.

По 25 г у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.