

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу.

1 флакон містить настойки плодів перцю стручкового (1:10) 50 мл;
допоміжна речовина: спирт етиловий 90 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина червонувато-жовтого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Код АТС МО2А В.
Фармакологічні властивості. Препарат чинить місцевоподразнювальну дію і при нанесенні на шкіру діє подібно до гірчичника.

Показання для застосування. Перцю стручкового настойку застосовують як місцевий подразнювальний та відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритах, ревматизмі.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність настойки в період вагітності та годування груддю не вивчалися, тому в цей період препарат не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не досліджена.

Діти. Безпека та ефективність застосування препарату у дітей не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не призначають.

Спосіб застосування та дози. Настойкою розтирають болючі місця 1-2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.

Передозування. Випадки передозування не спостерігалися.

Побічні ефекти. Препарат звичайно добре переноситься, але в окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття печіння, почервоніння шкіри, свербіж, висипи на місці нанесення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в прохолодному (8 - 15 °С), захищеному від світла місці. При зберіганні можливе випадання осаду. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.