

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СПИРТ МУРАШИНИЙ
(SPIRITUS ACIDI FORMICI)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, своєрідного запаху;

склад: 1 мл розчину містить кислоти мурашиної (в перерахуванні на 100%) 12,5 мг;

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Форма випуску. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС М02А Х10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють нервові закінчення, зокрема діють на чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних утворень препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

Фармакокінетика. Дослідження фармакокінетики препарату не проводились.

Показання для застосування. Невралгії, міозити, артралгії.

Спосіб застосування та дози. Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

Побічна дія. Можуть спостерігатися, особливо при підвищеній індивідуальній чутливості, сильне подразнення шкіри, висип, утворення пухирів.

Протипоказання. Спирт мурашиний протипоказаний при екземах, запальних і інфекційних захворюваннях шкіри, локалізованих в ділянці його застосування, а також при алергічних захворюваннях і підвищеній чутливості до нього.

Передозування. Випадків передозування не спостерігалось.

Особливості застосування. Не наносити на слизові оболонки та запобігати попаданню препарату в очі, оскільки спирт, що міститься в засобі, може спричинити опіки, сильне подразнення.

Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалась.

Вплив препарату на здатність керувати автотранспортом та працювати зі складними механізмами не описаний.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 8 °С до 15 °С. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл у флаконах.

Виробник. ВАТ «Фітофарм».

Адреса. Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.