

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: брильянтовий зелений;

100 г розчину містять брильянтового зеленого 1 г;

допоміжна речовина: етанол 60 %.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування спиртовий 1 %.

Прозора, інтенсивно-зеленого кольору рідина з запахом спирту.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Галичфарм».

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X09**.

Фармакологічні властивості

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування в кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.

Показання для застосування.

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

Протипоказання.

Алергічні реакції на компоненти препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі. Досвід застосування у дітей відсутній.

Особливі застереження.

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

Спосіб застосування та дози.

Наносять на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змазують краї повік.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (свербіж, кропив'янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слъозотеча, можуть з'явитися опіки.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

При одночасному застосуванні з будь-якими іншими лікарськими засобами слід повідомити лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С, на віддалі від вогню. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску.

Без рецепта.