

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %**  
**(UNGUENTUM ICHTHAMMOLI 10 %)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить іхтіолу 0,1 г;  
*допоміжна речовина:* вазелін.

**Лікарська форма.** Мазь.

Мазь темно-бурого кольору із запахом іхтіолу.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ "Фітофарм".  
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X10\*\*.

*Фармакологічні властивості.* Фармакологічні властивості мазі іхтіолової зумовлені дією біологічно активних речовин іхтіолу. Мазь іхтіолова має антимікробну (бактерицидну та бактеріостатичну), протизапальну та місцево знеболювальну дію.

При зовнішньому застосуванні іхтіолова мазь практично не абсорбується в системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

**Показання для застосування.**

Опіки, екзема, бешихове запалення, невралгія, артрити.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не можна допускати потрапляння мазі на слизові оболонки. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалась.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

**Діти.**

Досвід застосування у дітей не описаний.

**Спосіб застосування та дози.**

Мазь застосовують зовнішньо. Препарат наносять на уражену ділянку 2-3 рази на день відкритим або закритим (під пов'язкою) способом. Тривалість застосування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

**Передозування.**

Повідомлень про випадки передозування не надходило.

**Побічні ефекти.**

Можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 30 г у тубах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.