

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН

Склад лікарського засобу.

Діюча речовина:

100 г препарату містять йоду 1 г, калію йодиду 2 г;

допоміжні речовини: гліцерин, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора, сиропообразна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ “Фармацевтична фабрика “Віола”.

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла.

Антисептики. Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості. Люголя розчин чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії, в тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вуглярний протей.

Показання для застосування. Люголя розчин застосовують при різних запальних процесах слизових оболонок глотки та гортані - при хронічному ларингіті, тонзиліті, фарингіті.

Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості організму до йоду.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не досліджувалося.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не досліджувалося.

Діти. Препарат застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози. Препарат можна застосовувати як дорослим, так і дітям. Люголя розчин застосовують зовнішньо. Тампоном, змоченим препаратом, змащують слизові оболонки глотки та гортані. Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання та його вираженості.

Передозування. Можлива поява явищ йодизму (нежить, кропив'янка, слиновиділення, м'язова слабкість, загальмованість, набряк Квінке).

Побічні ефекти. Препарат звичайно добре переноситься, але при тривалому застосуванні, передозуванні або підвищеній чутливості можуть з'явитися явища йодизму (див. розділ “Передозування”).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у прохолодному (8-15 °С), захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.