

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки трави пустирника (1 : 5) 25 мл;

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина зеленкувато-бурого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ “Фітофарм”.

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M20.

За характером дії настойка пустирника близька до препаратів валеріани. Заспокійливий ефект відбувається за рахунок посилення процесу гальмування або зниження процесу збудження у центральній нервовій системі. Снодійного впливу не виявляє, але полегшує настання фізіологічного сну та поглиблює його. Не спричиняє явищ звикання, психічної залежності.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом), початкові стадії артеріальної гіпертензії, а також підвищена емоційна збудливість, дратівливість, легкі форми порушення сну.

Протипоказання.

Виражена артеріальна гіпотензія (знижений артеріальний тиск) та індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить спирт! Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід дотримуватися обережності при прийманні лікарського засобу через те, що препарат впливає на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. Седативний ефект розвивається повільно, протягом трьох тижнів.

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується застосовувати

дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Пустирника настойку приймають внутрішньо. Дорослим рекомендується застосовувати по 30 - 50 крапель настойки 3 - 4 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 - 4 рази на добу. Тривалість лікування визначається індивідуально.

Передозування.

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж), сонливість, запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює ефекти снодійних, аналгетичних та седативних засобів.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Допускається випадання осаду в процесі зберігання.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.