

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

Склад лікарського засобу:

Діюча речовина: 1 г мазі містить сірки осадженої 0,333 г;
допоміжні речовини: вазелін, емульгатор Т-2, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь для зовнішнього застосування.

Мазь жовтуватого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку.

Код АТС D10A B02.

Препарат чинить протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфідні і пентатіонова кислота, що мають вищевказану активність.

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання для застосування. У складі комбінованої терапії шкірних захворювань – себореї, сикозу, псоріазу, мікозу, корости.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік молодше 3 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у вагітних і в період годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь можна лише після оцінки співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або виконувати роботу, що потребує підвищеної уваги та швидкості реакцій.

Діти

При лікуванні дітей віком від 3 до 5 років мазь допустимо застосовувати після оцінки співвідношення ризик/користь.

Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо. Дорослим та дітям віком від 5 років мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2 - 3 рази на день. При лікуванні корости схема застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія мазі з окислювачами (водню пероксиду розчин, калію перманганат і т. ін.) може призвести до хімічного опіку.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка. По 40 г у тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.