

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВІГОР
(VIGOR)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина золотисто-коричневого кольору, з специфічним запахом;

склад: 100 мл препарату містять водно-спиртового екстракту (1:9,1) із лікарських рослин (кореневищ лепехи – 65,1 мг, кореневищ із коренями левзеї сафлороподібної (великоголовника) – 6 мг, трави деревію звичайного - 87 мг, трави полину гіркого – 12,9 мг, листя м'яти перцевої - 27 мг, листя бобівнику трилистого - 12,9 мг, квіток липи серделистої – 75,6 мг, плодів кропу пахучого – 36,9 мг, кори дуба звичайного – 6,6 мг) – 3 мл;

допоміжні речовини: цукор, колер, спирт етиловий, вода очищена.

1 мл містить 0,38 мл етанолу.

Форма випуску. Бальзам для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби.

КОД АТС А13А.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості бальзаму зумовлені дією компонентів, що входять до його складу. Бальзам Вігор містить ефірні олії, дубильні речовини, флавоноїди, каротин, органічні кислоти, лактони, фітонциди. Препарат чинить адаптогенну, антистресову, антиоксидантну, протизапальну дію, покращує розумову та фізичну працездатність, сприяє травленню, нормалізації функцій серцево-судинної системи. Підвищує резистентність організму до різних ендо- та екзотоксичних факторів, гіпоксії, активує ретикуло-ендотеліальну систему, певний імунокоригуючий ефект та антиалергічні властивості. Не чинить негативної дії на життєво важливі органи та системи.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Фізичні та емоційні перевантаження, стреси, астено-вегетативний синдром (підвищена стомлюваність, зниження працездатності, неврастенія, порушення сну). Захворювання, що потребують корекції імунного статусу, період реконвалесценції після тяжких інфекційних захворювань, при хронічних захворюваннях травного тракту. Бальзам призначають як профілактичний засіб особам, які працюють в умовах впливу хімічних, промислових та температурних факторів.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають дорослим внутрішньо по 20 - 30 мл 2-3 рази на день під час їди. Курс лікування 7 - 14 днів, за необхідності може бути продовжений до 30 днів. Повторний курс можливий після 5-7 денної перерви.

Побічна дія. При довготривалому застосуванні бальзаму у дозах, що перевищують рекомендовані, можливе підвищення артеріального тиску, головний біль.

Противопоказання. Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Алкоголізм, тяжкі форми ішемічної хвороби серця та есенціальної гіпертензії, виражені порушення функції печінки та нирок. Дитячий вік до 18 років. Період вагітності та годування груддю.

Передозування. При значному перевищенні дози можливе виникнення алкогольної інтоксикації, яка вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Особливості застосування. Препарат не призначають особам, діяльність яких потребує підвищеної уваги. Бальзам містить цукор, тому його з обережністю призначають хворим на цукровий діабет.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не вивчалась.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 15 °С до 25 °С, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 200 мл у флаконах та пляшках.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 250 мл, 500 мл у пляшках.

Виробник. ВАТ "Біолік".

Адреса. Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118;

тел./факс: (043-43) 6-49-33.