

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОКСОЛІН
(OXOLIN)

Загальна характеристика:

хімічна назва: оксолін (1,2,3,4-тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталіну дигідрат);

основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку;

склад: 1 г мазі містить оксоліну 0,0025 г (2,5 мг);

допоміжні речовини: олія мінеральна, парафін білий м'який.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на органи чуття. Противірусні засоби. Код АТХ S01A D10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат при місцевому застосуванні проявляє вірицидну дію на віруси грипу і аденовіруси. Блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (переважно типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. Активний відносно вірусів простого герпесу типів 1 і 2.

Фармакокінетика. Не вивчена.

Показання для застосування. Індивідуальна профілактика грипу в період епідемії; лікування вірусних ринітів, ринокон'юнктивітів. При ураженнях перехідного епітелія губ та геніталій, що викликані вірусом простого герпесу; для лікування оперізувального лишая, герпетичного дерматиту Дюринга, лускатого лишая, гострокірцевих кондилом, уражень шкіри, що викликані контагіозним молоском.

Спосіб застосування та дози. Для лікування вірусних ринітів та профілактики грипу препарат застосовують інтраназально. Дорослим та дітям, починаючи з 3 місяців, для лікування вірусного риніту змазують слизову оболонку носа 2–3 рази на добу впродовж 3–4 днів. Для індивідуальної профілактики грипу в період епідемії рекомендується щоденне змазування слизової оболонки носа вранці та ввечері, а також протягом доби безпосередньо перед можливим контактом з хворими на грип. При лікуванні герпетичних інфекцій препарат застосовують місцево. Лікування розпочинають при проявах перших симптомів захворювання. Препарат наносять тонким шаром на всю уражену ділянку шкіри і злегка втирають. Тривалість лікування зазвичай становить 14–28 днів. Тривалість застосування залежить від характеру і вираженості патологічного процесу, досягнутого ефекту.

Побічна дія. Іноді при застосуванні мазі спостерігається короткочасне відчуття печіння в місцях нанесення препарату, ринорея. При нанесенні мазі на патологічно змінену шкіру можлива поява відчуття печіння.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до оксоліну та інших компонентів препарату. Дитячий вік до 3 місяців.

Передозування. Випадки передозування не відомі.

Особливості застосування. Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру. Вагітні та жінки у період лактації застосовують препарат з обережністю у випадку, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода.

Взаємодія з лікарськими засобами. Рекомендується з обережністю застосовувати препарат одночасно з адреноміметичними засобами для інтраназального застосування внаслідок можливого пересушування слизової оболонки порожнини носа.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 10 С. Не допускати заморожування. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку. *Зберігати в недоступному для дітей місці!* Не застосовувати препарат після закінчення вказаного терміну придатності.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 г у тубах.

Виробник. ВАТ “Лубнифарм”.

Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.