

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МЕНОВАЗИН

Склад лікарського засобу:

Діючі речовини: ментол, новокаїн, анестезин;

1 мл розчину містить ментолу 25 мг (0,025 г), новокаїну 10 мг (0,01 г), анестезину 10 мг (0,01 г);

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Безбарвна, прозора рідина із запахом ментолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Протисвербіжні засоби.

Код АТС D04A X.

Фармакологічні властивості.

Меновазин має місцевоанестезуючий ефект. Препарат має також протисвербіжну дію.

При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного руслу.

Показання для застосування.

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях як місцевознеболюючий засіб.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших складових компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосування препарату в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Вплив на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

Діти.

Досвід застосування препарату у дітей відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирають Меновазином 2-3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

Передозування.

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти. Можливі подразнення шкіри, висипи.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Компоненти препарату (новокаїн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.