

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІОВ-ВЕНУМ

Склад лікарського засобу: 100 г препарату містять гамамеліс віргінський /Hamamelis virginiana/ D6 – 0,3мг, арніка гірська /Arnica montana/ D6 – 0,1мг, сірка /Sulfur/ D30 – 1×10^{-2} мг, отрута змії Бушмейстер /Lachesis/ D30 – 1×10^{-2} мг (за Гомеопатичною Фармакопеею Німеччини);
допоміжна речовина: етанол.

Лікарська форма. Краплі гомеопатичні.
Прозора безбарвна рідина із слабким запахом спирту.

Назва та місцезнаходження виробника:
ТОВ “ТАЛІОН-А”, Російська Федерація,
107370, м. Москва, Відкрите шосе, 12, будів.35.

Назва та місцезнаходження заявника:
ТОВ “ТАЛІОН-А”, Російська Федерація,
107370, м. Москва, Відкрите шосе, 12, будів.35.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Засоби, що застосовують при варикозному розширенні вен.
Фармакологічні властивості. Дія препарату обумовлена його активними компонентами.
Гамамеліс віргінський містить дубильні речовини, які чинять кровоспинну, ранозагоювальну та судинозвужувальну дію.
Арніка гірська здавна застосовується як антисептик, тонізуючий, ранозагоювальний засіб.
Сірка позитивно впливає на кровообіг, покращує стан венозної стінки, зменшує запалення, активує обмін речовин.
Іов-венум усуває застій крові, зміцнює еластичні волокна судин, виліковує трофічні зміни в тканинах.
Препарат швидко та майже повністю всмоктується після перорального застосування, переважно в порожнині рота і далі в шлунково-кишковому тракті, розподіляється в тканинах та рідинах організму.

Показання для застосування. В комплексній терапії варикозного розширення вен із запаленням, тромбофлебітом, виразками.

Протипоказання. Не виявлені.

Належні засоби безпеки при застосуванні. Особливих заходів безпеки не потребує.

Особливі застереження. Під час лікування доцільно додатково застосовувати еластичні бинти, спеціальні гольфи, панчохи та ін.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат може застосовуватися у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат в рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними засобами та обслуговувати механізми.
Діти Застосування у дітей не досліджувалося.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо дорослим, за півгодини і більше до їди або через 1 годину після їди. Приймають по 8-10 крапель 1 раз на добу на 1/4 склянки води.
Тривалість курсу лікування – до 2 місяців.

Передозування. Неможливе.

Побічні ефекти. Не зареєстровані.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат можна застосовувати з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не більше 25°C.

Упаковка. Флакони-крапельниці з темного скла по 25 мл у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.