

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЛЕВОМЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1 %**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 100 мл препарату містять хлорамфеніколу (левоміцетину) 1 г;

*допоміжна речовина:* спирт етиловий 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора безбарвна або із тріхи жовтуватим відтінком рідина, із запахом спирту.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ “Фармацевтична фабрика “Віола”.

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.** Антибіотики для місцевого застосування.

Код АТС D06A X02.

*Фармакологічні властивості.* Препарат чинить антимікробну, переважно бактеріостатичну дію при місцевому застосуванні щодо більшості грампозитивних і грамнегативних бактерій, порушуючи процеси синтезу білка. Впливає на збудників, стійких до антибіотиків групи пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів. Стійкість до хлорамфеніколу розвивається повільно. При зовнішньому застосуванні хлорамфенікол погано проникає через неушкоджену шкіру і слизові оболонки, тому резорбтивна дія його слабка. У середньому протимікробний ефект зберігається протягом 6 - 12 годин.

**Показання для застосування.**

Опіки, порізи, тріщини шкіри, отити та захворювання, ускладнені гнійною інфекцією.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату, дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, гостра інтермітуюча порфірія, шкірні захворювання (псоріаз, екзема, грибові ураження), період вагітності та годування груддю.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Препарат протипоказаний у період вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не досліджувалася.

**Діти.**

Не застосовують у новонароджених.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують дорослим та дітям старше 1 року. Змащують уражені ділянки шкіри (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Для лікування ран та опіків препарат наносять на уражені ділянки шкіри 4 - 5 разів на добу.

При гнійних отитах препарат закачують у зовнішній слуховий прохід (по 2 – 3 краплі). Процедуру повторюють 1 - 2 рази на день, а при значних виділеннях, які змивають нанесений розчин, – до 3 - 4 разів на день.

Тривалість застосування залежить від перебігу патологічного процесу, його вираженості та досягнутого ефекту.

**Передозування.**

При передозуванні препаратом можливе подразнення шкіри і слизових оболонок, місцеві алергічні реакції у вигляді висипу, свербіжжю, почервоніння і набрякості тканин.

Лікування симптоматичне.

**Побічні ефекти.**

При тривалому застосуванні можливі порушення з боку картини крові, функцій печінки і нирок, розвиток дисбактеріозу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати у прохолодному (8 - 15 °С), захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.