

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування|вживання| препарату  
**ПРОПОСОЛ-ЗДОРОВ'Я**  
**(PROPOSOL-ZDOROVYE)**

**Склад лікарського засобу.**

*Діюча речовина:* |

1 балон містить фенольний гідрофобний препарат прополісу у перерахуванні на 100 % вміст суми фенольних сполук 0,525 г або 1,05 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, гліцерин, хладон 134а.

**|Лікарська форма.** Аерозоль.

Препарат після видалення хладону 134а з аерозольної упаковки являє собою рідину від темно-жовтого до коричневого кольору з характерним запахом прополісу.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

**Фармакотерапевтична група.** Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування у стоматології. Код АТС А01А В11.

Препарат природного походження на основі продукту життєдіяльності бджіл – прополісу. Дія препарату обумовлена властивостями комплексу біологічно активних речовин прополісу (флавоноїди, флавоноїди, похідні коричної кислоти та ін.). Має протизапальні, протимікробні (відносно грампозитивних бактерій) та анальгезуючі властивості (спричиняє анальгезію слизових оболонок і шкіри, знижує болісність уражених тканин), сприяє росту грануляцій, прискорює процес регенерації та епітелізації ранових поверхонь; стимулює метаболічні процеси. Ефективний як у ранні терміни, так і при гнійно-некротичному процесі, що розвинувся.

**Показання для застосування|показники,показання|.** Місцеве лікування запальних захворювань (катаральний, афтозний, виразковий стоматит) і поверхневих ушкоджень слизової оболонки ротової порожнини, катарального гінгівіту, тонзиліту, глоситів.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату, наявність в анамнезі вказівок на алергічні реакції (особливо на продукти бджільництва), екзема (гострі форми), дитячий вік до 12 років, період годування груддю.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Неприпустиме потрапляння препарату в очі.

Аерозольний балон слід оберегти від удару, падіння, прямих сонячних променів.

**Особливі застереження.** Перед застосуванням препарату рекомендується промити порожнину рота теплою кип'яченою водою. Після зрощування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15–30 хв.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** В період вагітності препарат слід застосовувати з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода. При необхідності застосування в період лактації годування груддю рекомендується припинити.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні |спроможність|автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** У період лікування препаратом слід утриматися від керування автотранспортом та роботи зі складними механізмами.

*Діти*. Призначають дітям старше 12 років. |

**Спосіб застосування|вживання| та дози.** Призначають дорослим та дітям старше 12 років місцево на слизову оболонку порожнини рота шляхом зрошування. Тривалість розпилювання – 1–2 с.

Зрошують 2–3 рази на добу в гострому періоді запального процесу та 1–2 рази на добу при зниженні його вираженості. Курс лікування – 3–7 днів.

**Правила користування аерозольним балоном.**

1. Зняти запобіжний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на шток клапана.
2. Вільний кінець розпилювача ввести в порожнину рота і натиснути на головку розпилювача. Розпилюють у порожнині рота на фазі вдиху або на патологічне вогнище. Тривалість розпилювання – 1–2 с.
3. Закінчивши зрошування порожнини рота, закрити балон запобіжним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.
4. Розпилювач слід тримати в чистоті; після використання бажано промивати його під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплом місці.

**Передозування.** Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів препарату. *Лікування:* відміна препарату, промивання порожнини рота теплою кип'яченою водою.

**Побічні ефекти.** Препарат, як правило, переноситься добре, але в окремих випадках можливі алергічні реакції (дерматит, гіперемія), місцеві ефекти (відчуття печіння язика, сухість у роті).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не рекомендується застосовувати одночасно з іншими антисептичними засобами або продуктами бджільництва.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Оберігати від падінь, ударів і впливу прямих сонячних променів. Балон не розкривати. Не розпилювати поблизу вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** Аерозоль по 25 г або по 50 г у балоні аерозольному з насадкою в коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.