

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЕВКАМЕН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить ментолу 0,18 г або олії м'яти перцевої в перерахуванні на 80 % ментол 0,225 г, камфори 0,1 г, олії евкаліптової 0,1 г, олії гвоздичної 0,01 г;

допоміжні речовини: парафін, парафін м'який жовтий.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого із жовтуватим відтінком кольору, з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Фармакологічні властивості. Мазь подразнює нервові закінчення, чинить відволікальну, місцеву знеболювальну і протизапальну дію, яку зумовлюють речовини, що входять до її складу.

Показання для застосування.

Невралгії, міозити, артрити, ревматизм, ішіас.

Протипоказання.

Різні захворювання шкіри в місці, де треба наносити препарат. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння мазі в очі. У разі випадкового потрапляння в очі, необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря. Не наносити на слизові оболонки!

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосовувати мазь у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Ефективність і безпека застосування препарату дітьми не встановлена. За цієї причини його застосування дітьми до 12 років не рекомендується.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують дорослим і дітям старше 12 років зовнішньо, для розтирання. Кратність застосування і тривалість курсу лікування залежать від перебігу і тяжкості захворювання, досягнутого ефекту, характеру базисної терапії.

Передозування.

Алергічні реакції (кропив'янка, свербіж шкіри) у разі підвищеної чутливості до препарату.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Іноді може виникнути кропив'янка або подразнення шкіри на місці застосування мазі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 г у контейнерах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.