

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ**

Склад лікарського засобу:*діюча речовина:* йод;

100 мл розчину містять йоду 0,05 г (50 мг);

допоміжні речовини: калію йодид, етанол, вода очищена.**Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Рідина червоно-бурого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код ATC D08A G03.

Фармакологічні властивості.

Препарат містить елементарний йод, для якого характерними є протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дія. При нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму. Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

Показання для застосування.

Застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікачу дію).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при діабетичних, трофічних виразках.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Слід бути обережними при застосуванні йоду на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Не допускати потрапляння препарату в очі. Слід бути особливо обережними при застосуванні йоду у пацієнтів зі світлим волоссям.

Не слід застосовувати на великі ділянки шкіри через можливий розвиток опіку.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Відсутні.

Способ застосування та дози.

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

Передозування.

При передозуванні можливі явища йодизму (нежиття, кропив'янка, набряк Квінке, сльозотеча, слинотеча, вугрові висипи на шкірі), опіки, подразнення шкіри.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можлива поява нежиття, кропив'янки, набряку Квінке, сльино- та сльозотеча, висипів на шкірі, контактного дерматиту.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів.

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °C до 15 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 мл, 100 мл у флаконах, по 20 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску.

Без рецепта.