

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ОКУЛОХЕЕЛЬ

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 1 капсула (0,45 мл) містить: Euphrasia D5 – 110,7 мг, Cochlearia officinalis D5 – 110,7 мг, Pilocarpus D5 – 110,7 мг, Echinacea D5 – 110,7 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат, динатрію фосфат дигідрат.

Лікарська форма. Краплі очні.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Препарат чинить протизапальну, знеболювальну та протиалергічну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування. Подразнення, запалення або алергічні реакції з боку кон'юнктиви та повік внаслідок зовнішніх подразників; перенапруження очей, синдром «сухого ока».

Протипоказання. Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Капсула використовується одноразово, відкривати безпосередньо перед вживанням.

Не застосовувати залишки розчину.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Доцільність застосування препарату вирішується індивідуально з урахуванням співвідношення користь для матері / ризик для плода.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.

Діти. Див. “Спосіб застосування та дози”.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років – по 2 краплі у хворе око 3 рази на добу, немовлятам та дітям віком до 1 року – по 1-2 краплі у хворе око 1 раз на добу, дітям віком від 1 до 3 років – по 2 краплі 1-2 рази на добу, дітям віком від 3 до 6 років – 2 краплі 2 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років – 2 краплі 2-3 рази на добу.

Курс лікування – 1 – 3 тижні.

Передозування. Не відзначалось.

Побічні ефекти. В окремих випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (місцеві алергічні реакції).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Капсули зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. По 0,45 мл розчину в поліетиленовій капсулі, по 15 (5x3) капсул у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.