

ІНСТРУКЦІЯ **для медичного застосування препарату**

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: плоди глоду;

1 мл настойки містить плодів глоду 0,1 г (1:10);

допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %, отриманий зі спирту 96 %.

Лікарська форма.

Настойка.

Прозора рідина жовто-бурого кольору. Допускається випадання осаду в процесі зберігання.

Назва і місцезнаходження заявника.

Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-Фарм-Плюс» «Докфарм».

Україна, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Індустріальна, 7.

Назва і місцезнаходження виробника.

Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-Фарм-Плюс» «Докфарм».

Україна, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Індустріальна, 7.

Фармакотерапевтична група.

Кардіологічні препарати. Код АТС С01Е В04.

Плоди глоду містять комплекс біологічно активних речовин: флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти. Препарати глоду посилюють кровообіг у коронарних судинах серця та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів, певною мірою посилюють скорочення серцевого м'яза та зменшують його збудливість, чинять заспокійливу дію, нормалізують артеріальний тиск.

Показання для застосування.

Функціональні розлади серцево-судинної системи, а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія) та на початкових стадіях артеріальної гіпертензії.

Протипоказання.

Тяжка форма артеріальної гіпотензії, брадикардія, підвищена

чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослині.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

На період лікування пацієнтам, які приймають настоянку, слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами, у зв'язку із вмістом спирту етилового.

Не слід порушувати рекомендації щодо застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Препарат містить спирт етиловий, тому не рекомендується застосовувати засіб у період вагітності, годування груддю, а також дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймають внутрішньо до їди.

Дози і тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру і ступеня тяжкості патологічного процесу, особливостей перебігу захворювання, досягнутого ефекту та переносимості препарату.

Дорослим та дітям старше 12 років – по 20 крапель настоянки 3 рази на день. Тривалість лікування до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, послаблення серцебиття) – до 6 тижнів.

Передозування.

При значному перевищенні рекомендованих доз препарату виникає сонливість, сповільнюється пульс.

У разі передозування слід припинити застосування препарату. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж шкіри).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може посилювати дію серцевих глікозидів та антиаритмічних препаратів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.

Термін придатності.

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в прохолодному (8-15°C), захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання глуду настійки можливе випадання осаду.

Упаковка.

По 50 мл, 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.