

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФУРАЦИЛІН
(FURACILINI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 мл розчину містять 0,066 г (66 мг) фурациліну;

допоміжні речовини: етанол 70 %.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора рідина жовтого кольору зі спиртовим запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Похідні нітрофурану. Код АТС D08A F01.

Фурацилін є антибактеріальним засобом. Порушує утворення ацетил-КоА з пірвіноградної кислоти, тобто обмін енергії і синтетичні процеси в мікробній клітині. Пригнічує ріст і розмноження стафілококів, стрептококів, дизентерійної палички, кишкової палички, сальмонели паратифу, збудника газової гангрені та інших грампозитивних та грамнегативних бактерій.

Показання для застосування.

Хронічні гнійні отити, фурункули зовнішнього слухового проходу.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість (ідіосинкразія). Застосування протипоказане особам з алергічними дерматозами.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності та під час годування груддю доцільність застосування препарату вирішує лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не спостерігалась.

Діти

Доцільність застосування препарату у дітей віком до 12 років вирішує лікар.

Спосіб застосування та дози.

Фурацилін застосовують зовнішньо. 8 - 10 крапель розчину наносять на ватний тампон або турунду і вводять у зовнішній слуховий прохід 2 рази на день. Попередньо розчин слід підігріти до температури тіла. Термін лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

При застосуванні великих доз препарату можливе посилення проявів описаної побічної дії. У таких випадках прийом препарату припиняють.

Побічні ефекти.

При зовнішньому застосуванні препарат зазвичай добре переноситься. В окремих випадках можливі дерматити, що потребують тимчасової перерви у лікуванні або припинення застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в прохолодному (8 - 15 °С), захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.