

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РЕВАЛІД

Склад лікарського засобу:

діючі речовини:

1 капсула містить DL-метіоніну 100 мг, L-цистину 50 мг, кальцію пантотенату 50 мг, тіаміну гідрохлориду 1,5 мг, піридоксину гідрохлориду 10 мг, кислоти пара-амінобензойної 20 мг, екстракту проса сухого (1-3:1) 50 мг, екстракту паростків пшениці сухого 50 мг (що відповідає 55,6 мг свіжих паростків пшениці), дріжджів медичних 50 мг, комплексу мікроелементів 65 мг (у тому числі заліза 2 мг, цинку 2 мг, міді 0,5 мг);

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, желатин, хіноліновий жовтий (E 104), індигокармін (E 132).

Лікарська форма. Капсули.

Капсули з корпусом прозорого світло-зеленого кольору та кришечкою прозорого темно-зеленого кольору. Вміст капсули – неоднорідний жовтувато-коричневий порошок.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary).

H-4042 м. Дебрецен, вул. Паллагі, 13, Угорщина (Pallagi str. 13, H-4042 Debrecen, Hungary).

Фармакотерапевтична група. Інші дерматологічні засоби. Код АТС D11A.

Фармакологічні властивості. Препарат може замінити денну норму вітамінів, мікро- та макроелементів, оскільки він містить речовини, необхідні для нормального росту, розвитку та відновлення волосся і нігтів. Ревалід забезпечує волосся та нігті речовинами, необхідними для побудови волоссяних фолікулів, зміцнення нижніх шарів шкіри, підтримання гарного вигляду верхнього шару волосся.

Препарат добре впливає на структуру волосся, усуває себорею, лупу та свербіж. Хелатоформуючі мікроелементи, що містяться в препараті, мають високий рівень абсорбції. Екстракт проса (*Extractum Milii flavi*) містить велику кількість біологічно активного кремнію, який відіграє суттєву роль у біосинтезі кератину та сполучної тканини.

Окрім вмісту різних вітамінів групи В, медичних дріжджів (*Faex medicinalis*), препарат багатий на біокатализатори, необхідні для росту клітин. Екстракт паростків пшениці (*Extractum Triticis germinis*) містить істотну кількість стеролу, лецитину, вітамінів А, D і Е, а також лінолеву кислоту.

Показання для застосування.

Порушення росту та структури волосся. Випадіння волосся (під час чи після якої-небудь хвороби; під час вагітності; через нестачу вітамінів та мікроелементів, які надходять з їжею; через виснаженість чи фізичні розлади; після медикаментозної терапії).

Порушення росту та структури нігтів неінфекційної природи.

Протипоказання.

Випадання волосся внаслідок ендокринних порушень. Інфекційні захворювання нігтів.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не відомі.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовують відповідно до показань для застосування. Перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або робот з іншими механізмами.

Не відома.

Діти. Не застосовують у дітей віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для дорослих і дітей старше 12 років – по 1 капсулі 3 рази на день, відразу після або під час їди. Курс лікування звичайно триває 2 - 3 місяці. Здебільшого випадання волосся нефізіологічного характеру припиняється вже після 1-го місяця лікування, а протягом 2-го чи 3-го місяця застосування препарату спостерігаються значні зміни у структурі волосся.

Якщо необхідно, курс лікування подовжують або повторюють.

У тяжких випадках рекомендовано по 2 капсули 3 рази на день протягом 1-го місяця, після чого застосовують звичайний курс лікування - по 1 капсулі 3 рази на день.

Передозування.

Не відоме.

Побічні ефекти.

При застосуванні 6 капсул на день можливі незначні розлади травлення, у цьому разі потрібно зменшити дозування до 1 капсули 3 рази на день.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Лікування препаратом слід припинити в разі необхідності застосування сульфаніламідів, оскільки параамінобензойна кислота, що є складовою препарату, впливає на ефективність застосування сульфаніламідів.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі 15 - 25 °С у захищеному від вологи місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.