

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить сірки осадженої 0,333 г;
допоміжні речовини: парафін жовтий м'який, емульгатор Т-2, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь жовтого або світло-жовтого кольору без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку. Код АТС D10A B02.

Препарат чинить протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, що мають вищевказану активність.

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання для застосування.

У складі комбінованої терапії шкірних захворювань – себореї, сикозу, псоріазу, мікозу, корости.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік молодше 3 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у вагітних і в період годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

При лікуванні дітей віком від 3 до 5 років мазь допустимо застосовувати після оцінки співвідношення ризик/користь.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують зовнішньо. Дорослим та дітям віком від 5 років мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2 - 3 рази на день. При лікуванні корости схема застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія мазі з окислювачами (водню пероксиду розчин, калію перманганат і т. ін.) може призвести до хімічного опіку.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 20 г та по 25 г у банці або у тубі.

Категорія відпуску.

Без рецепта.