

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: : кореневища з коренями валеріани;

1 флакон містить настойки кореневищ із коренями валеріани (1 : 5) 25 мл;

допоміжні речовини: етанол 70 %.

1 мл містить 20 крапель.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина червонувато-бурого кольору, з характерним ароматним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Снодійні та седативні препарати. Код АТС N05C M09.

Фармакологічні властивості. Біологічно активні речовини, що містяться в коренях та кореневищах валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), зменшують процеси збудження в центральній нервовій системі, посилюють ефекти інших седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності центральної нервової системи (підвищена емоційна збудливість, дратівливість, розлади сну тощо), серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії).

Протипоказання.

Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням центральної нервової системи, підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що входять до складу препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати рекомендації щодо застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності та годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується вживати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

На період лікування пацієнтам, які приймають настойку, слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами, у зв'язку із вмістом спирту етилового.

Діти.

Препарат містить спирт етиловий, тому не рекомендується застосовувати засіб дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймають внутрішньо.

Дорослим рекомендується приймати по 20 - 30 крапель настойки 3 - 4 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям старше 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 - 4 рази на день.

Передозування.

При значному перевищенні рекомендованих доз препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, відчуття серцебиття.

У разі передозування слід припинити застосування препарату. Терапія симптоматична (промивання шлунку, прийом активованого вугілля тощо).

Побічні ефекти.

Валеріани настойка, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності. Можливі алергічні реакції (почервоніння, висипи, свербіж шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Валеріани настойка має здатність потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях або флаконах полімерних.

Категорія відпуску.

Без рецепта.