

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Bryonia alba (Бріонії альби) 200СН 20 мг; Spongia (Спонгії) 200СН 20 мг; Ipecacuanha (Іпекакуани) 200СН 20 мг; Verbascum (Вербаскуму) 50СН 20 мг; Kalium bichromicum (Каліуму біхромікуму) 200СН 20 мг;
допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули. Гомеопатичний лікарський засіб.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Полегшує кашель, сприяє відходженню мокротиння, зменшує запалення дихальних шляхів.

Показання для застосування.

Симптоматична терапія при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.

Лікування та профілактика рецидивів гострих і хронічних ларингітів, трахеїтів, бронхітів.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям старше 7 років - по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 1 до 7 років - із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом), розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули слід приймати за 15 - 20 хв до або через 1 годину після їди.

Приймати 2 – 6 разів на добу, залежно від тяжкості стану, до повного одужання.

При гострому початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин. Далі перейти на прийом 2 - 6 разів на добу.

Після одужання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу протягом 7 днів з метою профілактики ускладнень.

При хронічних бронхітах приймати 1 – 2 рази на добу. Курс лікування – 2 - 3 місяці.

За необхідності курс повторити через 2 – 3 тижні.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.