

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГАСТРО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Anacardium (Анакардіуму) 200СН 20 мг; Nux vomica (Нукс воміка) 1000СН 20 мг; Arsenicum album (Арсенікуму альбуму) 1000СН 20 мг; Argentum nitricum (Аргентуму нітрикуму) 1000СН 20 мг; Kalium bichromicum (Каліюму біхромікуму) 200СН 20 мг;
допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули. Гомеопатичний лікарський засіб.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Послаблює біль, явища диспепсії, прискорює загоєння ерозій та виразок. Чинить регулювальну дію на вегетативну нервову систему, сприяє поліпшенню мікроциркуляції в ділянці травного тракту, покращує перистальтику.

Показання для застосування.

Гастрити, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами повинен становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Немає протипоказань щодо застосування препарату у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям старше 7 років – по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 1 до 7 років – із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом), розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули слід приймати за 15 - 20 хв до або через 1 годину після їди.

Приймати 3 – 5 разів на добу до стійкого покращання стану.

Після зникнення симптоматики рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу протягом 7 днів.

При хронічних гастритах – 1 – 2 рази на добу протягом 2 – 3 місяців.

За необхідності курс лікування повторити через 2 - 3 тижні.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.