

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УРО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Berberis (Берберису) 200СН 20 мг; Colchicum (Колхікуму) 200СН 20 мг; Acidum oxalium (Ацидуму оксалікуму) 200СН 20 мг; Acidum phosphoricum (Ацидуму фосфорикуму) 200СН 20 мг; Colocynth (Колоцинту) 200СН 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули. Гомеопатичний лікарський засіб.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Сприяє розчиненню конкрементів і перешкоджає їх утворенню в сечі. Чинить спазмолітичну дію на м'язи сечовивідних шляхів, зменшує запалення, полегшує болі, пов'язані із сечовипусканням.

Показання для застосування.

Лікування та профілактика сечокам'яної хвороби. Сечокислий діатез. Подагра. Запальні захворювання сечовивідних органів.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не призначають дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям старше 12 років – по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 3 до 12 років – по 3 гранули на 1 прийом, розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули приймати за 15 – 20 хвилин до або через 1 годину після їди.

Приймати 1 раз на добу – уранці натщесерце, протягом 2 – 3 місяців.

За необхідності курс лікування повторити після перерви у 2 – 3 тижні.

При нирковій коліці – по 3 гранули 3 - 5 разів протягом 1 години.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.