

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХОЛЕ-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Chelidonium (Хелідоніуму) 200СН 20 мг, Lycoperodium (Лікоподіуму) 200СН 20 мг, Berberis (Берберису) 200СН 20 мг, Carduus marianus (Кардусу маріанусу) 50СН 20 мг, Taraxacum (Тараксакуму) 50СН 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули. Гомеопатичний лікарський засіб.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Послаблює біль, спазми жовчовивідних шляхів, диспептичні розлади. Сприяє утворенню та відтоку жовчі, поліпшує перистальтику кишечника. Сприяє регенерації печінкових клітин після гострих гепатитів (інфекційний гепатит В, інтоксикаційні гепатити).

Показання для застосування.

Гострі та хронічні захворювання печінки та жовчовивідних шляхів. Хронічні холециститу, гепатити, дискінезії жовчовивідних шляхів. Жовчнокам'яна хвороба. Запори. Як гепатопротектор при променевої та хіміотерапії. Неспецифічна профілактика вірусного гепатиту.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям старше 7 років – по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 1 до 7 років – із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом), розчинені в невеликій кількості води або під язик.

Гранули слід приймати за 15 - 20 хв до або через 1 годину після їди.

Приймати 1 – 2 рази на добу протягом 2 – 3 місяців.

За необхідності курс лікування повторити через 2 – 3 тижні.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.