

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, бронхіальна астма, недостатність в організмі аргініносукцинатсинтетази (порушення обміну речовин у циклі сечовини).

Схильність до ларингоспазму.

Дитячий вік до 2 років (через наявність у складі ментолу, олії м'яти перцевої, олії евкалипту).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У випадку якщо поліпшення стану хворого не настає, або у разі появи нападів задухи, гнійного мокротиння, а також при підвищенні температури тіла слід негайно звернутися до лікаря.

Особливі застереження.

Оскільки ГЕДЕЛИКС®краплі без спирту не містить етанолу та цукру, його можна застосовувати хворим на цукровий діабет.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

ГЕДЕЛИКС®краплі без спирту не рекомендується застосовувати у період вагітності та період годування груддю (у зв'язку з недостатністю клінічних даних).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Можливе застосування, оскільки препарат у своєму складі не містить алкоголю.

Діти.

Протипоказаний дітям віком до 2 років.

Спосіб застосування та дози.

ГЕДЕЛИКС®краплі без спирту слід застосовувати нерозведеним, незалежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Дітям рекомендується давати препарат розведеним у фруктовому соці або чаї.

Тривалість застосування залежить від виду та тяжкості захворювання, але навіть при легкому перебігу захворювань дихальних шляхів лікування препаратом необхідно проводити не менше одного тижня. Після зникнення симптомів хвороби лікування ще слід продовжити 2-3 дні.

Краплі приймають 3 рази на день.

Нижче наведена таблиця застосування препарату для різних вікових груп.

Вікова група	Разова доза	Кратність прийому	Добова доза
та діти старше 10 років	31 крапля	3 рази/день	93 краплі
ли віком 4-10 років	21 крапля	3 рази/день	63 краплі
ги віком 2 - 4 роки	16 крапель	3 рази/день	48 крапель

Передозування.

Симптоми: можливі нудота, блювання, діарея.

Лікування: симптоматичне.

Побічні ефекти. Алергічні реакції, нудота, блювання, діарея, рідко може спостерігатися біль в епігастральній ділянці.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

5 років.

Термін придатності після розкриття флакону - 6 місяців.

Після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, препарат не застосовувати.

Помутніння препарату або утворення осаду, що може виникнути при зберіганні протягом терміну придатності, не зменшує активності препарату і не є перешкодою для його застосування.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Флакони-крапельниці по 50 мл, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.