

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ДУБА КОРА
(QUERCUS CORTEX)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 пачка містить кори дуба 100 г.

Лікарська форма. Кора.

Шматочки кори різної форми; колір світло-бурий, світло-сірий, сріблястий або жовтувато-бурий; запах слабкий, своєрідний; сильнов'язучий смак.

Назва і місцезнаходження виробника.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітолік».

Україна, 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 183, корп. 1.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для застосування у стоматології.

Код АТС А01А D11.

Дуба кора містить речовини дубильні, флавоноїди (кверцетин тощо), кислоти галову та елагову, флорафен, пентозани, пектини, цукри, слиз, білкові речовини, крохмаль, речовини мінеральні. Цей комплекс біологічно активних речовин проявляє в'язучі, протизапальні, протигнильні властивості.

Показання для застосування.

Застосовують зовнішньо при стоматитах, гінгівітах, парадонтозах, фарингітах, трахеїтах – запальних захворюваннях ротової порожнини і горла.

Противпоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Немає особливих заходів безпеки при застосуванні Дуба кори.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності і годування груддю не вивчалися.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Дуба кори у дітей не встановлені, тому не рекомендується застосовувати препарат дітям.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують у вигляді настою: 20 г (2 столові ложки) кори вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водній бані 30 хв, після чого негайно проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Об'єм відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл. Застосовують для полоскання ротової порожнини і горла 6 - 8 разів на день.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначається індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні ефекти.

Не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці при температурі від 15 °С до 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску.

Без рецепта.