

ІНСТРУКЦІЯ

Передозування.

Симптоми: артеріальна гіпотензія, підвищена пітливість, відчуття жару, запаморочення, нудота, порушення зору. *Лікування:* відміна препарату, промивання шлунка з активованим вугіллям, застосування сольових проносних. Симптоматична терапія. Специфічного антидоту немає.

Побічні ефекти.

З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, запор;

з боку центральної нервової системи: сонливість, посилене потовиділення;

з боку серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, зменшення серцевого викиду, внаслідок чого можливе погіршення показників електрокардіограми;

алергічні реакції: шкірний висип, свербіж, кропив'янка, набряк Квінке.

У разі появи будь-яких небажаних явищ хворому необхідно порадитися з лікарем!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При сумісному застосуванні з фентоламіном, бета-блокаторами та іншими антигіпертензивними засобами, діуретиками підсилюється гіпотензивний ефект.

Однотимчасний прийом препарату з бета-адреноблокаторами запобігає посиленню загального периферичного опору судин, що спричиняють бета-адреноблокатори.

При одночасному застосуванні зменшує ефект метилдопи.

Ефективність препарату знижується при тютюнопалінні.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Для лікарського препарату не потрібні спеціальні умови зберігання. Зберігати препарат в оригінальному пакуванні.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 таблеток у блістер, по 1 блістеру в пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.