

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПІВОНІЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: настойка із півонії незвичайної трави, кореневищ з коренями (1:10).

допоміжна речовина: етанол 40 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина світло-коричневого кольору зі специфічним запахом; можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група.

Снодійні та седативні засоби. Код АТХ N05C M17**.

Трава, кореневища та корені півонії незвичайної (*Paeonia anomala*) містять феноли, дубильні речовини, органічні кислоти. Настойка півонії підвищує опір організму до гіпоксії, має спазмолітичні, протисудомні, антимікробні властивості та здатність підвищувати кислотність шлунка.

Показання для застосування.

Невротичні, нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом.

Протипоказання.

Артеріальна гіпотензія, індивідуальна непереносимість біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослинній сировині, період вагітності та годування груддю, дитячий вік.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалому прийомі великих доз препарату необхідно контролювати кислотність шлунка в пацієнтів з тенденцією до її підвищення.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю через вміст етанолу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

У період лікування настойкою півонії пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидких психічних і рухових реакцій.

Діти.

Досвіду застосування препарату у дітей немає, тому він не рекомендований до застосування у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Настойку півонії приймають внутрішньо за 10 – 15 хвилин до їжі. Дорослим призначають по 15 – 20 крапель настойки 2 – 3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2 – 3 місяці).

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються зниження артеріального тиску, запаморочення, сонливість.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і вжити заходів симптоматичної та підтримуючої терапії (у відповідності з клінічним станом хворого).

Побічні ефекти.

Артеріальна гіпотензія, сонливість, загальна слабкість, а також розвиток алергічних реакцій (висипи, свербіж, гіперемія та набрякання шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію седативних і снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків та антидепресантів з седативною дією.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або 100 мл у флаконах; по 50 мл або 100 мл у флаконі в пацці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.